

Что делать, если у вас температура 100,4 °F (38 °C) или выше

1. **Немедленно позвоните своему врачу-онкологу** — даже в выходные, праздники или посреди ночи.
Не принимайте без разрешения врача жаропонижающие препараты, такие как аспирин, ацетаминофен (Tylenol), ибупрофен (Advil, Motrin) или напроксен (Aleve).
2. Если в течение 20 минут вам никто не перезвонит, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи. Еще раз позвоните своему врачу и сообщите, в какое отделение неотложной помощи вы собираетесь обратиться.
3. Если вы обратились в отделение неотложной помощи, сразу по прибытии сообщите в регистратуре и персоналу приемного отделения следующую информацию:
 - то, что вы проходите лечение рака;
 - имя и фамилию вашего врача-онколога;
 - то, что у вас жар, и это чрезвычайная ситуация.



Если у вас жар, немедленно сообщите об этом сотрудникам регистратуры отделения неотложной помощи и персоналу приемного отделения. Жар указывает на то, что у вас может быть инфекция. Это может угрожать вашей жизни, и вас следует как можно скорее осмотреть.

Если ваш врач считает, что у вас критическое состояние, он может посоветовать вам вызвать машину скорой помощи. В данном случае это все ради вашей безопасности.

Не забудьте предоставить персоналу отделения неотложной помощи копию списка назначенных вам лекарств.

Мой врач: _____

Телефон моего врача: _____

В экстренных случаях звоните 911.

Если вы позвоните врачу в нерабочее время, система должна перенаправить вас на автоответчик. Если вы не можете связаться с Онкологическим центром UH Seidman Cancer Center **в нерабочее время, в выходные или праздничные дни**, звоните на автоответчик напрямую по номеру 1-877-669-2902.

В следующих случаях немедленно звоните своему врачу



У вас перечисленные ниже признаки инфекции

- Температура 100,4 °F (38 °C) или выше.
- Появление либо ухудшение лихорадки, озноба или высокой потливости.
- Покраснение, острый дискомфорт, выделения (гной), боль или отек в любых местах, включая раны и места уколов и внутривенного вливания.
- Появление либо ухудшение одышки.
- Сыпь или новые язвы на коже.
- Боль в горле, новые язвы или белые пятна во рту.
- Боль в придаточных пазухах носа, давление или заложенность носа.
- Тошнота (рвота).
- Мутная моча или моча с кровью.
- Потребность в частом мочеиспускании, боль или жжение во время мочеиспускания
- Появление либо изменение кашля или кашель с зеленой или желтой слизью (мокротой).
- Ненормальные вагинальные выделения или зуд.
- Скованность мышц шеи.
- 3 или более жидких водянистых испражнений в течение 24 часов (диарея).
- Новые болевые ощущения.
- Спутанность сознания или беспричинное ощущение сильной сонливости или беспокойства.

Другие причины обратиться к врачу

- Неспособность есть и пить в течение 12 часов.
- Новое кровотечение или синяк.
- Новые изменения состояния кожи, сыпь или волдыри.
- Жалобы или вопросы, связанные со здоровьем.
- Симптомы или побочные эффекты, которые проявились впервые или стали ухудшаться.



В экстренных случаях звоните 911.